

hepatoselüler nekroz, siroz, Rhodanin ve orcein ile her zaman lizozomal Cu boyanması gösterilmeyebilir, boyama olmaması ya da az olması ekarte etmez. Wilson hastalarında Cu'ın koruyucu etkisi nedeniyle **HCC gelişme riski düşüktür**. Tanı alan her hasta nörolojik bulgu olmasa da kranial MRI ile değerlendirilmelidir. Wilson hastalarında otoantikör pozitifliği görülebilir.

73- Doğru Cevap C şıkkıdır.

Hipokalsemi ağır pankreatite prognozu belirleyen bir komplikasyondur pankreatit etyolojisinde hiperkalsemi yer alır.

74- Doğru Cevap A şıkkıdır.

Henöch-Schönlein purpurasının FMF ile birlikteliği vardır.

75- Doğru Cevap C şıkkıdır.

Kromozom anomalilerinde alfa fetoprotein seviyesi düşer.

76- Doğru cevap E şıkkıdır.

Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) tip 3 , Allagille sendromunda olduğu gibi GGT normal kolestaz nedenlerinden biridir.

77- Doğru cevap D şıkkıdır.

Hipotiroidi kemik yaşını en fazla geride bırakan hastalıktır. Bununla birlikte Puberte tardaya neden olabilir.

78- Doğru cevap E şıkkıdır.

79- Doğru cevap C şıkkıdır.

80- Doğru cevap D şıkkıdır.

Havayolu ile bulaşan (air borne) M.tuberculosis, tüberküloz, suçiçeği , diğerleri dalacık yoluyla bulaşa örnektir.