

# 2020 YDUS DAHİLİYE

ENFEKSİYON HASTALIKLARI REFERANS

# SORU NO: 1

## Anti Retroviral İlaçlar-2

- **Proteaz inhibitörleri**

- Saquinavir
- Ritonavir
- İndinavir
- Nelfinavir
- Atazanavir
- Darunavir
- Fosamprenavir
- Lopinavir / Ritonavir
- Tipranavir

- **İntegraz inhibitörleri**

- Raltegravir
- Elvitegravir
- Dolutegravir
- Bictegravir

- **Maturasyon inhibitörleri**

- Bevirimat

- **Füzyon inhibitörleri**

- Enfuvirtide

216

- «Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar» başlıklı konumuzda anlattığım gibi, Raltegravir bir integras inhibitörü anti retroviral ilaçtır.

# SORU NO: 2

**Table 2** Recommended Adult Immunization Schedule by Medical Condition and Other Indications, United States, 2020

Vaccine	Pregnancy	Immuno-compromised (excluding HIV infection)	HIV infection CD4 count		Asplenia, complement deficiencies	End-stage renal disease; or on hemodialysis	Heart or lung disease, alcoholism*	Chronic liver disease	Diabetes	Health care personnel†	Men who have sex with men	
			<200	≥200								
IV or RIV	1 dose annually											
LAIV	NOT RECOMMENDED					PRECAUTION				1 dose annually		
Tdap or Td	1 dose Tdap each pregnancy	1 dose Tdap, then Td or Tdap booster every 10 years										
MMR	NOT RECOMMENDED			1 or 2 doses depending on indication								
VAR	NOT RECOMMENDED			2 doses								
RZV (preferred)	DELAY				2 doses at age ≥50 years							
ZVL	NOT RECOMMENDED			1 dose at age ≥60 years								
HPV	DELAY	3 doses through age 26 years				2 or 3 doses through age 26 years						
PCV13	1 dose											
PPSV23	1, 2, or 3 doses depending on age and indication											
HepA					2 or 3 doses depending on vaccine							
HepB					2 or 3 doses depending on vaccine							
MenACWY	1 or 2 doses depending on indication, see notes for booster recommendations											
MenB	PRECAUTION	2 or 3 doses depending on vaccine and indication, see notes for booster recommendations										
Hib			3 doses HSC† recipients only		1 dose							

  Recommended vaccination for adults who meet age requirement, lack documentation of vaccination, or lack evidence of past infection  
  Recommended vaccination for adults with an additional risk factor or another indication  
  Precaution—vaccination might be indicated if benefit of protection outweighs risk of adverse reaction  
  Delay vaccination until after pregnancy if vaccine is indicated  
  Not recommended/contraindicated—vaccine should not be administered  
  No recommendation/Not applicable

«Erişkin Aşılması» başlıklı dersimizde immun kompromize hastalarda varicella aşısı kontrendike olarak gösterilmektedir.

# SORU NO: 3

## Antipsödomonal Etkinliği Olan Antibiyotikler

- Piperasilin-Tazobaktam
- Doripenem
- İmipenem
- Meropenem
- Meropenem -Vaborbaktam
- Aztreonam
- Siprofloksasin
- **Delafloksasin**
  - İlk MRSA etkinliği olan kinolon
  - QT aralığını uzatmaz
  - Anaerobik etkinlik +
  - Anti-tbc etkinlik +
- Levofloksasin
- **Prulifloksasin**
  - Japonyada +
  - Aktivite siprofloksasin gibi
- Seftazidim
- Sefepim
- Seftazidim-Avibaktam
- Seftolozan- Tazobaktam
- Gentamisin
- Tobramisin
- Amikasin
- Polimiksin B
- Kolistin

239

## ESBL + Mikroorganizmalara Etkili Antibiyotikler:

- Meropenem \*
- İmipenem-silastatin\*
- Ertapenem (daha az etkili)
- Doripenem (daha az etkili)
- Meropenem-vaborbaktam
- Seftazidim-avibaktam
- Seftolozan-tazobaktam
- Fosfomisin (iv – oral)
- Tigesiklin, Omadasiklin, Eravasiklin
- Kolistin
- Polimiksin B

Soru bankasında örnek sorularda yer alan açıklamalarımda da belirttiğim gibi, dirençli gram negatif bakterilere karşı etkili olan antibiyotikler arasında seftriakson yer almamaktadır.

## SORU NO: 4

- Daha önceden kuduz aşılı olanlarda
  - son aşıdan <6 ay ise tek doz,
  - son aşı 1 yıl önce ise 0-3. günler HDCV aşısı yapılır.
- Yara yeri infeksiyonu için antibiyotik tedavisi
  - (penisilin ya da metronidazol)
- Tetanoz aşısı 10 yılı geçmişse rapel yapılır. Aşısız ise aşı programına alınır.

80

«Kuduz» başlıklı konuda ilgili soruyla ilgili yanıtı bulabilirsiniz.

## SORU NO: 5

- İkincil Alternatif İlaçlar:
    - Primetamin ve klindamisin + lökoverin
    - Primetamin / Sulfadiazin + atovakuan: Hafif tablolu erişkinlerde
  - Diğer İlaçlar:
    - Azitromisin
    - Klaritromisin
    - Dapson
- Primetamin ile kombine

Toksoplazmoz dersinde ilaçlar anlatılmıştır.